



Prova Teórica - Seleção de Residência em Medicina Veterinária-25/01/2014

Área do Candidato: **CLINICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA**

Numero de Inscrição:

Nome do Candidato:

Assinatura do Candidato:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - Você está recebendo o seguinte material: Este caderno com 20 questões de múltipla escolha (objetivas), sendo 04 questões de Políticas Públicas em Saúde e 16 questões relativas à área pretendida para ingressar no programa de Residência em Medicina Veterinária do Hospital Veterinária da UFRRJ;
- 2 - Verifique se a prova está completa. Caso contrário, notifique imediatamente a um dos responsáveis;
- 3 - Você deverá assinar todas as folhas, no espaço indicado, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- 4 - Há apenas uma resposta certa por questão de múltipla escolha;
- 5 - Esta prova é individual. São vedados: o uso de calculadora, qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. Celulares devem permanecer desligados;
- 6 - Você terá 2 (duas) hora para responder às questões;
- 7 - Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal toda a prova;
- 8 - Os 3 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da prova;
- 9 - O gabarito estará disponível após o término da prova no mural da residência.

BOA PROVA!

Prova Teórica - Seleção de Residência em Medicina Veterinária-25/01/2014**Área do Candidato: CLINICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA**

Numero de Inscrição:

Nome do Candidato:

Assinatura do Candidato:

QUESTÃO 01- No caso de uma obstrução intestinal, por corpo estranho linear, a conduta adequada deve ser:

- (A) Seccionar o fio que se encontra na base da língua
- (B) Enterotomia na porção pilórica, por ser o ponto mais comum de obstrução.
- (C) Entero anastomose da área pregueada
- (D) Enterotomia em duas porções do intestino, no intestino.
- (E) Exame da cavidade oral e enterotomias para desfazer as pregas.

QUESTÃO 2- A torção do lobo pulmonar (TLP) resulta do deslocamento físico e torção um lobo pulmonar em torno do seu pedículo broncovascular. Sua ocorrência é mais comum em cães de grande porte, sendo o lobo pulmonar envolvido:

- (A) lobo médio do pulmão direito
- (B) lobo caudal do pulmão direito
- (C) lobo cranial do pulmão esquerdo
- (D) lobo médio ou caudal do pulmão esquerdo
- (E) lobo cranial do pulmão direito

QUESTÃO 3- Os músculos que compõem a anatomia da hérnia perineal e estão envolvidos na técnica de herniorrafia por transposição do músculo obturador interno são:

- (A) elevador lateral do sacro, esfíncter anal interno e obturador interno
- (B) músculo isquiorretal, músculo bulbo esponjoso e elevador do ânus e coccígeo
- (C) elevador do ânus, coccígeo, obturador interno e esfíncter anal interno
- (D) esfíncter anal externo, elevador do ânus, obturador interno e perineal transverso
- (E) elevador do ânus, obturador interno, esfíncter anal externo, coccígeo, elevador da cauda.

QUESTÃO 4- Em relação a displasia coxo-femural em cães, é incorreto afirmar:

- (A) a displasia é uma doença multifatorial
- (B) a displasia pode apresentar sintomatologia clínica severa em alguns animais, mesmo que os achados radiográficos não sejam alarmantes
- (C) é uma doença que acomete somente raças de grande porte
- (D) os fatores ambientais podem interferir no desenvolvimento da doença em animais jovens
- (E) a substituição da articulação pela prótese pode proporcionar ao animal a condição de plena reparação da articulação.

QUESTÃO 5- No caso de uma intussuscepção em canino, que apresenta alteração na consistência, coloração escura e grave aderência da porção envolvida, qual o procedimento indicado no tratamento ?

- (A) desfazer a intussuscepção somente
- (B) enterotomia
- (C) ressecção da porção e enteroanastomose
- (D) enteropexia
- (E) avaliação da víscera, após desfazer a intussuscepção e hidratar.

QUESTÃO 6- Assinale a alternativa correta :

- (A) ureter ectópico é a desembocadura do ureter em uma posição anormal na bexiga e/ou na uretra
- (B) herniorrafia é a hérnia que está aderida ao saco peritonial
- (C) uretostomia é a fixação da uretra através da dissecação romba do corpo cavernoso
- (D) ovariosalpingohisterectomia é a técnica de cesariana preservando os ovários
- (E) ureter ectópico e ureterocele, correspondem a mesma lesão congênita.

QUESTÃO 7- O movimento de gaveta positivo, no exame físico de um canino com claudicação, caracteriza a ruptura do ligamento cruzado cranial do cão. As técnicas cirúrgicas corretivas versam sobre vários princípios. Baseado nisso, marque a alternativa correta:

- (A) A técnica de Paatsama, foi baseada na angulação do platô tibial, em relação a superfície condilar femoral.
- (B) A técnica de avanço da tuberosidade tibial, foi delineada de acordo com a rotação que o platô da tibia deveria sofrer para neutralizar a resultante de forças do fêmur sobre o platô tibial
- (C) todas as técnicas que se baseiam na aplicação de fios, para estabilizar a articulação não apresentam resultado, mesmo nas raças miniaturas e toys.
- (D) O ponto isométrico do joelho, pode ser facilmente estabelecido, levando em conta a distância da crista tibial até o sesamóide poplíteo.
- (E) Slocum em 1983, conseguiu determinar as forças resultantes do fêmur que atuavam sobre a tibia e assim, estabeleceu um novo conceito para tratamento da lesão do ligamento cruzado cranial.

QUESTÃO 8- A cistostomia temporária, ou cateterização pré-púbica, é realizada para promover:

- (A) desvio urinário cutâneo em animais com obstrução urinária, ou com uretras traumatizadas ou reparadas cirurgicamente.
- (B) para evitar prostatomegalia
- (C) em casos de ureter ectópico, até que seja feito o diagnóstico definitivo
- (D) drenagem vesical nos casos de nefrectomia
- (E) nos casos de fratura do íleo que promova desvio anatômico do osso pélvico.

QUESTÃO 9- O fechamento prematuro das fises radial ou ulnar distais pode ocasionar:

- (A) a necessidade de realizar uma ostectomia no rádio para corrigir a deformação, independente de qual fise sofreu fechamento
- (B) incongruência da articulação escapulo-umeral contralateral
- (C) desvio angular caracterizado por rádio curvo, varo e rotação interna
- (D) incongruência do cotovelo
- (E) achatamento da articulação carpo radial devido desproporção de crescimento entre os ossos.

QUESTÃO 10- O uso da haste bloqueada para tratamento de fraturas de ossos longos promove:

- (A) estabilidade apenas rotacional, pela presença da haste impactada dentro do canal medular.
- (B) resistência à carga axial e dobramento não neutralizando as forças de rotação.
- (C) resistência às forças de dobramento, carga axial e rotacional.
- (D) impedimento para formação do calo ósseo, devido ao diâmetro da haste que ocupa todo canal medular.
- (E) retardo na formação do calo ósseo devido a completa obliteração do canal medular

QUESTÃO 11- Sobre as obstruções esofágicas extraluminares provocadas por anormalidades vasculares, é correto afirmar:

- (A) o diagnóstico dessa condição é através do histórico, exame físico, radiografias simples e contrastada.
- (B) o tratamento clínico é bastante efetivo em todos os casos.
- (C) no exame radiológico contrastado, é possível verificar a completa dilatação do esôfago em toda sua extensão.
- (D) o tratamento cirúrgico é realizado através da ressecção e anastomose do esôfago.
- (E) não é possível o tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 12- As discopatias toracolombares representam 84 a 86% dos problemas de discos intervertebrais em cães. Baseado nisso podemos afirmar que as vértebras mais frequentemente envolvidas são:

- (A) L4 – L5
- (B) T12 – T13
- (C) L2 – L3
- (D) T6 - T7
- (E) T10-T11

QUESTÃO 13- Ao realizarmos uma colecistoduodenostomia, estamos promovendo:

- (A) desvio do fluxo biliar para uma nova região do intestino
- (B) anastomose entre duas porções duodenais
- (C) utilização do duodeno para recompor a bexiga após remoção por neoplasia
- (D) união do duodeno a porção cística do estômago
- (E) uma nova bexiga com parte do duodeno

QUESTÃO 14- As obstruções da saída gástrica, também conhecidas como hipertrofia crônica da mucosa antral ou estenose pilórica, são passíveis de correção cirúrgica. Uma dessas técnicas, é a piloroplastia de Heineke-Mikulicz, que consiste em:

- (A) realizar uma incisão longitudinal através das camadas serosa e muscular, sem atingir a camada mucosa, para permitir sua descompressão.
- (B) realizar uma incisão longitudinal, em todas as camadas, no piloro e estendê-la ao estômago formando dois braços em forma de Y. Executar a sutura de fechamento para que as bordas se unam em forma de U.
- (C) realizar uma incisão em espessura completa do piloro e suturar transversamente as camadas em plano único.
- (D) Essa técnica se aplica para os casos de gastrectomia parcial e não para o piloro
- (E) Essa técnica também é conhecida com Y a ROUX.

QUESTÃO 15- O colapso traqueal se caracteriza por uma diminuição do lúmen traqueal e pode ter uma extensão variável, assim como os sintomas. São indicados tratamentos clínico e cirúrgico. Baseado nisso o tratamento cirúrgico fica indicado quando:

- (A) para os casos com sintomas leves com redução de 30% do lúmen traqueal.
- (B) para os casos com sintomas graves mesmo que com redução de 20% do lúmen traqueal.
- (C) o tratamento cirúrgico não costuma promover resultados satisfatórios.
- (D) para os casos com sintomas de moderado a grave com redução de 50% ou mais do lúmen traqueal.
- (E) quando o paciente possui histórico de outras cirurgias do sistema respiratório superior.

QUESTÃO 16- No caso de nos depararmos com um paciente que apresente não-união de uma fratura, é correto afirmar:

- (A) A não-união hipertrófica ou “pata de elefante” costuma proporcionar os melhores resultados depois de instituído o tratamento para viabilizar a consolidação óssea.
- (B) A não-união conhecida como atrófica apresenta excelentes resultados, bastando apenas imobilizar o membro com uma muleta de Thomas por 30 dias.
- (C) As não-uniões ósseas de uma fratura se dividem em viáveis e não viáveis, sendo essa uma classificação meramente didática, pois a apresentação radiológica e o tratamento são os mesmos.
- (D) As não-uniões conhecidas como moderadamente hipertrófica ou “casco de cavalo” e a necrótica se equivalem em termos radiológicos e prognóstico, sendo que ambas não apresentam resultados satisfatórios.
- (E) Todas as não-uniões viáveis, ocorreram por falta de imobilização no pós-operatório.

QUESTÕES SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 17 - De acordo com a Lei nº 8080 de 1990 – Lei Orgânica da Saúde, os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), são:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II - integralidade de assistência para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- III - não divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelos usuários.
- IV - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V - participação popular.

Estão corretos os itens:

- (A) I, III, IV e V
- (B) Somente os itens I, II e IV
- (C) Somente os itens I e II
- (D) Os itens I, II, IV e V
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 18- O sistema de Informação que tem por objetivo o registro e o processamento dos dados sobre agravos de notificação compulsória em todo território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal é:

- (A)SINS – Sistema de Informações Notificáveis de Saúde;
- (B)SIM – Sistema de Informações de Morbimortalidade;
- (C)SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação;
- (D)SIAS – Sistema de Internação de Agravos de Saúde;
- (E)SIDN – Sistema de Informação de Doenças Notificáveis.

QUESTÃO 19- Na Saúde Pública, uma das principais atividades dos médicos-veterinários diz respeito aos acidentes com animais peçonhentos, que ocorrem tanto em áreas urbanas como nas rurais e silvestres. No que diz respeito aos animais peçonhentos, considere as opções abaixo e assinale a que está CORRETA:

- (A)É importante eliminar os animais peçonhentos das regiões onde ocorrem os acidentes, utilizando-se de defensivos químicos apropriados, de modo a prevenir novos acidentes.
- (B)A principal medida a ser tomada com o indivíduo acidentado é fazer garrote ou torniquete imediatamente e, em seguida, procurar atendimento médico.
- (C)Animais peçonhentos são aqueles que produzem substância tóxica e apresentam estruturas especializadas para inoculação deste veneno.
- (D)A época de frio e seca é a mais favorável para a ocorrência dos acidentes, correspondendo na Região Sudeste, aos meses de maio a setembro, pois é quando os animais peçonhentos estão em maior atividade.
- (E)A forma mais eficiente de tratamento para acidentados por serpente, escorpião e algumas aranhas é a imunoprofilaxia ativa.

QUESTÃO 20- Quanto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), julgue os itens a seguir:

- I - Têm por objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
- II - Fazem parte da atenção básica, se constituindo como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- III - Podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, sendo que o médico veterinário só poderá integrar o NASF 2.
- IV - A composição de cada NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas.

Está(ao) correto(s) o(s) item(ns):

- (A)Somente o item I está correto.
- (B)Os itens I, III e IV estão corretos.
- (C)Os itens I e IV estão corretos.
- (D)Somente o item IV está correto.
- (E)Todos os itens estão corretos.