TRATAMENTO DURANTE A GESTAÇÃO E NO PERÍODO PÓS-PARTO COM SULFADIAZINA ASSOCIADA À PIRIMETAMINA DE GATAS PORTADORAS DE INFECÇÃO NATURAL POR *CYSTOISOSPORA FELIS* (WENYON, 1923) E *C. RIVOLTA* (GRASSI, 1879) (APICOMPLEXA: CYSTOISOSPORINAE).

Z.G. LOSS¹ & C.W.G. LOPES²

(1) Departamento de Clínica e Cirurgia, IV; (2) Departamento de Parasitologia Animal, IB, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR-465, Km 7, 23.851-970 Seropédica, RJ, Brasil.

SUMÁRIO: A um grupo de sete gatas gestantes, positivas para *Cystoisospora felis* e *C. rivolta*, mantidas em isolamento, aplicou-se tratamento, com sulfadiazina e pirimetamina nas dosagens diárias de 100/ mg/kg/dia e 1 mg/kg/dia, respectivamente. O tratamento foi começado aproximadamente no trigéssimo dia de gestação, terminando 30 dias após o parto. Os 42 filhotes destas gatas foram desmamados aos trinta dias de idade e as fezes foram recolhidas e examinadas diariamente por um período subsequente de 20 dias, não se encontrando oocistos. Nas fezes de 28 filhotes de um grupo de seis gatas testemunhas, mantidas sob as mesmas condições, tratadas com placebo, encontraram-se diariamente oocistos das espécies acima citadas, por 20 dias pós-desmama, quando cessaram os exames. Como orientação à prática clínica, pode-se indicar este tratamento para gatas gestantes quando se objetiva obter filhotes livres de *C. felis* e/ou *C. rivolta* em condições sanitárias adequadas.

PALAVRAS - CHAVE: Gatas prenhes, cistoisosporose, sulfadiazina, pirimetamina, prevenção, filhotes.