

OCORRÊNCIA DE ÁCAROS HEMATÓFAGOS EM AVIÁRIOS DE POSTURA NO ESTADO DE SÃO PAULO.

E. C.TUCCI¹, J. H. GUIMARÃES², T. V. BRUNO¹, N. M. S. Q. GAMA³ & A. M. M. SANTOS⁴.

(1)Seção de Parasitoses, Instituto Biológico, Caixa Postal 7119, 01064-970, São Paulo, Brasil; (2) Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 4365, 01061-970; (3) Laboratório de Patologia Avícola de Bastos, Rodovia Bastos-Rancharia Km1; (4) SUCEN, Rua Paula Souza,166. São Paulo, Brasil.

SUMÁRIO: O presente trabalho teve como objetivo identificar as espécies de ácaros hematófagos que ocorrem em aviários de postura no Estado de São Paulo. No período de fevereiro de 1988 a dezembro de 1990 foram visitadas 43 granjas de aves poedeiras, criadas em sistemas de confinamento, localizadas nos municípios de Araçatuba, Assis, Bady Bassit, Bastos, Caucaia do Alto, Guararapes, Ibiúna, Itapetininga, Pindamonhangaba, Pirassununga, Porto Feliz, São Manuel e Sorocaba. As amostras de ácaros foram coletadas nas instalações e nas aves. Exemplares adultos foram montados em meio de Hoyer e identificados. Das 43 propriedades visitadas, 11 (25,6%) estavam parasitadas por *Dermanyssus gallinae*, 6 (13,9%) por *Ornithonyssus sylviarum*, em 15 (34,9%) encontrou-se as duas espécies, e em 11 (25,6%) nenhuma das espécies de ácaros. *O.bursa* não foi encontrado nas localidades visitadas. Observações sobre o manejo e os métodos de controle e produtos químicos utilizados, são discutidos.

PALAVRAS - CHAVE: *Dermanyssus gallinae*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus bursa*, ácaros.